भारतीय कृषी संशोधन परिषद-राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र

या आठवड्यातील हवामान अंदाज

गुरुवार (22/10/2026) – बुधवार) 28/10/2026)

स्थान	तापमान (°C)		पावसाची शक्यता	ढगांचे आच्छादन	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास) किमान-कमाल	सापेक्ष आर्द्रता %
	किमान	कमाल				
नाशिक	15-20	32-33	**नाशिक, ओझर, कळवण, पिंपळगाव बसवंत, दिंडोरी, पालखेड, लोणी, वणी-** गुरु ते बुध- पाऊस नाही.	स्वच्छ ते ढगाळ	04-16	23-38
पुणे	17-21	33-34	**पुणे, फुरसुंगी, लोणी काळभोर, उरुळी कांचन, पाटस, यवत, नारायणगाव, इंदापूर, बारामती -** गुरु ते बुध- पाऊस नाही**.**	स्वच्छ ते ढगाळ	05-15	22-37
सोलापूर	15-22	31-33	**सोलापूर, नान्नज, वैराग, औसा, बार्शी , लातूर , तुळजापूर -** गुरु ते बुध - पाऊस नाही. **पंढरपूर** - बुध - रिमझिम पाऊस.	स्वच्छ ते ढगाळ	04-13	29-41
सांगली	16-22	34-35	**मिरज, सांगली, आळवा, कवठा, खानापूर-विटा, शेटफळ, शिरगुप्पी** - गुरु ते बुध - पाऊस नाही. **पलसी, पलूस –** गुरु- रिमझिम पाऊस	स्वच्छ ते ढगाळ	07-19	21-36
विजयपुरा	18-22	33-35	**विजयपुरा, चडचन, तिकोटा, तेलसंग**- गुरु ते बुध - पाऊस नाही.	स्वच्छ ते ढगाळ	17-27	18-31
हैदराबाद	19-21	33-34	**हैदराबाद, मेदचल, झहिराबाद** - गुरु ते बुध - पाऊस नाही.	स्वच्छ ते ढगाळ	17-23	23-39
सातारा	15-22	31-33	**खटाव, सातारा, फलटण** - गुरु ते बुध - पाऊस नाही.	स्वच्छ ते ढगाळ	04-13	29-41
अहमदनगर	16-19	32-34	**अहमदनगर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, अकोले, राहाता, कोपरगाव, संगमनेर** - गुरु ते बुध- पाऊस नाही.	स्वच्छ ते ढगाळ	09-29	22-37
जालना	15-20	33-34	**जालना, अंबड, घनसावंगी, मंठा, जाफ्राबाद-** गुरु ते बुध- पाऊस नाही.	स्वच्छ ते ढगाळ	06-22	24-38
बुलडाणा	15-20	30-32	**बुलढाणा, दि. राजा, सिंदखेड राजा, चिखली** - गुरु ते बुध- पाऊस नाही.	स्वच्छ ते ढगाळ	13-34	26-40
कोल्हापूर	16-21	33-34	**कागल, करवीर, गगन-बावडा**- - गुरु ते बुध-	स्वच्छ ते	07-14	25-41

भारतीय कृषी संशोधन परिषद का राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, पुणे
ICAR-National Research Centre for Grapes, Pune
NRCG

			पाऊस नाही.	ढगाळ		
बंगळुरू ग्रामीण	15-20	26-39	**अनकल, दोड्डाबल्लापूर, बेंगळुरू-पूर्व, बेंगळुरू-उत्तर, बेंगळुरू**- गुरु, शुक्र, शनि, रवि- रिमझिम ते मध्यम पाऊस.	स्वच्छ ते ढगाळ	11-17	36-71
बेलागावी	16-20	31-32	**बेळगाव, गोकाक, चिकोडी** - शुक्र - रिमझिम पाऊस**. अथणी**- गुरु ते बुध- पाऊस नाही.	स्वच्छ ते ढगाळ	06-11	27-50
बिदर	15-19	31-33	**बिदर, हुमनाबाद, बसवकल्याण** - गुरु ते बुध- पाऊस नाही.	स्वच्छ ते ढगाळ	14-20	28-49
बागलकोट	18-22	34-35	**बागलकोट, जमखंडी, हुंगुंड**- गुरु ते बुध- पाऊस नाही. **मुधोळ-** शुक्र, शनि- रिमझिम पाऊस.	स्वच्छ ते ढगाळ	17-27	18-31

टीप: वरील हवामान माहिती खालील संकेतस्थळांवर दिलेल्या हवामान अंदाजाचा सारांश आहे

https://www.wunderground.com/?cm_ven=cgi

https://imdagrimet.gov.in/weatherdata/BlockWindow.php

https://www.timeanddate.com/weather/india

भाकृअनुप-राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र अचूकतेचा दावा करत नाही.

II. पाणी व्यवस्थापन (डॉ. ए.के. उपाध्याय):

भारतीय कृषी संशोधन परिषद-राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, पुणे

पाणी व्यवस्थापन (डॉ. ए.के. उपाध्याय)

अपेक्षित पॅन बाष्पीभवन: 6.5 - 7.5 मिमी

शिफारस केलेले सिंचन प्रमाणः

1. जर माती वाप्सा (क्षेत्र क्षमता) स्थितीत असेल तर द्राक्षबागेला पाणी देऊ नये.
2. अंकुर वाढीच्या अवस्थेत (फळ छाटणीचा हंगाम), ठिबकद्वारे @ 11050 -12750 लि./एकर/दिवसाने सर्व द्राक्ष उगवणाऱ्या प्रदेशांना पाणी द्यावे. आवश्यकतेपेक्षा जास्त जोम असल्यास, सिंचन पाणी वापर अर्ध्याने कमी करून 5500-6350 लि/एकर करा आणि नत्र वापरणे थांबवा. तरीही वाढ जास्त असल्यास वाढ आटोक्यात येईपर्यंत पाणी देणे थांबवावे व नंतर सिंचन सुरू करावे.
3. फ्लॉवरिंग ते सेटिंग अवस्थेत (फळ छाटणीचा हंगाम), ठिबकद्वारे @ 3600 - 4200 लि./एकर/दिवसाने सर्व द्राक्ष उगवणाऱ्या प्रदेशांना पाणी द्यावे.

माती आणि पोषक व्यवस्थापन :

छाटणीपूर्व अवस्था - फळ छाटणीचा हंगाम

1. जर पुढील 10-15 दिवसांत खरड छाटणीचे नियोजन केले असेल, तर खरड छाटणीच्या हंगामासाठी पोषक तत्त्वे आणि पाणी वापराचे वेळापत्रक नियोजन करण्यासाठी माती आणि पाण्याचे परीक्षण करण्याचा सल्ला दिला जातो.
2. ज्या द्राक्षबागांमध्ये सोडीयमची समस्या आहे, तेथे माती एक्सचेंज कॉम्प्लेक्समधून सोडियम काढून टाकण्यासाठी जमिनीत जिप्सम टाकावा. जर माती चुनखडीयुक्त असेल तर जमिनीतील वेलींमध्ये 50 किलो/एकर सल्फर टाकावा. कॅल्शियम कार्बोनेटची काळजी घेण्यासाठी त्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी गंधक जमिनीत व्यवस्थित मिसळले पाहिजे. शेणखत/ कंपोस्टमध्ये गंधक मिसळल्याने त्याची कार्यक्षमता आणखी सुधारते.
3. चुनखडीयुक्त जमिनीच्या बाबतीत, एसएसपी बेसल डोस म्हणून वापरल्यास, फॉस्फरस स्थिरीकरण टाळण्यासाठी शेणखत/कंपोस्ट इत्यादी मिसळा.

काढ़ी ची वाढ़ अवस्था

1. सेंद्रिय खतांचा वापर केल्यास, C:N प्रमाण तपासा. नायट्रोजन सोडण्याचे प्रमाण कमी करा, त्यामुळे वाढ वाढण्याची शक्यता आहे. वेलीच्या वाढीवर आधारित नायट्रोजन वापरावर नियंत्रण ठेवा.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद-राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, पुणे
ICAR-National Research Centre for Grapes, Pune

2. माती परीक्षण मूल्याच्या आधारे, अंकुर वाढीच्या अवस्थेत या आठवड्यात युरिया @ 15 किलो / एकर दोन विभागांमध्ये वापरा. जर माती चुनखडीयुक्त असेल तर या आठवड्यात युरियाऐवजी अमोनियम सल्फेट @ 30 किलो/एकर तीन स्प्लिटमध्ये टाका. पिकाच्या जोमावर अवलंबून नत्र वापराचे नियमन करा.
3. सोडिसिटीची समस्या असल्यास, या आठवड्यात 10 किलो सल्फेट ऑफ पोटॅश प्रति एकर 2 स्प्लिटमध्ये टाका.
4. जोपर्यंत पाने पूर्णपणे विकसित होत नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही पर्णसंभारासाठी पोषक तत्वांचा वापर करू नका. त्यामुळे फवारणीचा अपव्यय होईल.
5. पानांच्या सहाय्याने लावावयाच्या पोषक घटकांचे प्रमाण, छतच्या आकारावर अवलंबून असते.
6. जर पीक 5 पाने ते बहर येण्यापूर्वीच्या अवस्थेत असेल, तर माती परीक्षण मूल्यावर आधारित झिंक सल्फेट आणि फेरस सल्फेट प्रत्येकी 15 किलो / एकर वापरा. बोरॉनचा वापर जर माती परीक्षण मूल्य कमी असल्याचे दर्शवित असेल आणि सिंचनाच्या पाण्यात बोरॉन नसेल तरच केला पाहिजे. जर फाउंडेशन पेनिंग सीझनमध्ये, पेटीओल चाचणीने बोरॉनची कमतरता असल्याचे सांगितले तर माती परीक्षण मूल्यानुसार @ 1.5 किलो ते 5 किलो बोरॉन वापरा. एका वेळी एक किलो बोरॉन टाका.
7. पीक 5 पाने ते बहरण्यापूर्वीच्या अवस्थेत असल्यास 10 किलो मॅग्नेशियम सल्फेट प्रति एकर द्यावे.

फ्लॉवरिंग ते सेटिंग स्टेज:

1. कूज (फुलणे नेक्रोसिस) च्या समस्या टाळण्यासाठी फुले येण्याच्या अवस्थेपर्यंत नत्रावर आधारित कोणतेही खत घालू नका.

2. या आठवड्यात 3-4 किलो फॉस्फोरिक ऍसिड दोन ते तीन भागांमध्ये टाका. लक्षात ठेवा की सिंचनाच्या पाण्याचा pH 6.0 च्या जवळ असावा किंवा SSP @ 125kg/acre बेसल ऍप्लिकेशन म्हणून वापरा. फॉस्फरसचे निर्धारण कमी करण्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वी एसएसपी शेणखत/कंपोस्टमध्ये मिसळावे.

3. पेटीओल न्यूट्रिएंट टेस्टिंग: 70% कॅपफॉल स्टेजवर, पोटीओलचे नमुने पोषण विश्लेषणासाठी घेतले पाहिजेत. नमुन्यासाठी घडासमोरील पान काढून टाकावे.

III. कॅनोपी व्यवस्थापन (डॉ.पी.एच.निकुंभे):

द्राक्षबागेतील सध्याच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार आणि हवामानाच्या परिस्थितीनुसार खालील अवथथेतील करावयाच्या उपाययोजना.

1) सध्याची स्थिती

द्राक्ष हे संवेदनशील पीक आहे आणि कमी पावसामुळे जमिनीतील ओलावा कमी झालेला दिसतो , तर वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवन वाढत आहे. यामुळे वेलीला पाण्याचा ताण बसतो, पाने सुकतात, घडनिर्मिती कमी होते, मण्यांचा आकार लहान राहतो आणि गुणवत्तेवर परिणाम होतो. उष्णतेमुळे फळांना सनबर्न होण्याचीही शक्यता असते. काळ्या मातीच्या प्रदेशात पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त असली तरीही दीर्घकाळ दुष्काळामुळे समस्या निर्माण होवू शकते.

2) प्री-ब्लूम अवस्थेतील बागांसाठी (दर्जेदार लांब घड मिळवण्यासाठी):

निर्यातीसाठी लांब व पसरट घड (रॅकिसची लांबी व दोन खोडांतील अंतर वाढलेले) मिळवायचे असल्यास GA□ फवारणी फक्त प्री-ब्लूम अवस्थेत करावी.

उशिरा छाटलेल्या बागांसाठी GA□ चे वेळापत्रक:

- पहिली फवारणी: पोपटी हिरवा घड दिसताच GA□ @ 10पीपीएम (फळछाटणीनंतर साधारण 18-19 दिवसांनी)
- दुसरी फवारणी: पहिल्या फवारणीनंतर ५-६ दिवसांनी GA□ @ 15 पीपीएम

GA□ ची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या बाबी:

- फवारणीच्या पाण्याचा pH: 6.5 ते 7.5
- तयार GA□ द्रावणाचा pH: 5.5ते 6.0 → सिट्रिक ऍसिड @ 0.5 ग्रॅम/लिटर किंवा युरिया फॉस्फेट @ 1.0 ग्रॅम/लिटर वापरून pH कमी करा

- बागेतील सापेक्ष आर्द्रता 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त असतानाच फवारणी करा → संध्याकाळी फवारणी करणे अधिक फायदेशीर
- GA□ फवारणीपूर्वी झिंक + बोरॉन यांची एक फवारणी करा, यामुळे GA□ ची कार्यक्षमता वाढते

3) प्री-ब्लूम ते फुलोऱ्याच्या अवस्थेतील बागांसाठी:

- GA□ फवारणी फक्त स्वच्छ व ढग नसलेल्या हवामानात करावी, यामुळे उत्तम परिणाम मिळतो.
- चांगल्या हवेशीरपणासाठी व बुरशीनाशकाची योग्य झाकणी मिळण्यासाठी खालची 2 ते 3 पाने काढावीत.

पांढऱ्या बिनबियाण्या जातींसाठी **(थॉम्पसन सीडलेस व तास-ए-गणेश):**

- पूर्ण फुलोऱ्याच्या वेळी (full bloom) GA□ @ 25 पीपीएम फवारणी केल्यास दाण्यांची गळ (थिंनिंग) चांगली होते कारण GA□ येथे परागनाशक म्हणून काम करते.

लांबट घडांच्या जातींसाठी (सोनाका, माणिक चमन, सुपर सोनाका, सारीता सीडलेस, कृष्णा सीडलेस, SSN इत्यादी): या जातींसाठी GA□ चे वेळापत्रक वेगळे आहे:

अ) प्री-ब्लूम अवस्था: GA_3 @ 10 पीपीएम

ब) प्री-ब्लूम अवस्था (5-6 दिवसांनी): GA_3 @ 15 पीपीएम

क) 25% फुलोरा: GA_3 @ 10 पीपीएम

ड) 50% फुलोरा: GA_3 @ 10 पीपीएम

इ) 60-80% फुलोरा: GA_3 @ 10 पीपीएम

ई) 90-100% फुलोरा: GA_3 @ 60 पीपीएम

g) दाणे बसल्यानंतर (berry set नंतर): GA_3 @ 40-50 पीपीएम + IAA @ 10 पीपीएम

भारतीय कृषी संशोधन परिषद-राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, पुणे
ICAR National Research Centre for Grapes, Pune

4) मणी सेटिंग ते 8 मिमी दाण्याच्या आकारापर्यंतच्या बागांसाठी:

- ज्या बागेत दाणे बसून झाले आहेत तेथे **घड गळ व दाणे गळ** यांना अत्यंत महत्त्व द्यावे.
- घड ठेवण्याची संख्या उद्देशानुसार (मनुका, स्थानिक बाजार, निर्यात) ठरवावी.
- घडातील दाण्यांची संख्या ही घडाचा प्रकार, जात इत्यादीनुसार ठरवावी.
- जातीवर आधाररत मणीची धारणा खालीलप्रमाणे आहे.

जाती	ऱ्याचिसची/घडाची सिंख्या		मणी /घडाची ची सिंख्या	
	स्थानिक	निर्यात	स्थानिक	निर्यात
थॉम्पसन सीडलेस	12-14	10-12	130-140	100-120
तास-ए-गणेश	12-14	10-12	130-140	100-120

सोनाका	14-16	10-12	140-150	130-140
माणिक चमन	14-16	10-12	140-150	130-140
सरीता सीडलेस	14-16	10-12	140-150	130-140
रेड ग्लोब	10-12	8-10	80-90	70-75
नानासाहेब परपल सीडलेस	10-12	8-10	80-90	75-80
क्रिमसंन सीडलेस	10-12	10-12	120-130	100-120

- ढगाळ हवामानात GA_3 ची फवारणी टाळा.
- शेडनेट आणि क्रॉप कव्हर: 30-50 टक्के शेडनेट किंवा नॉन-व्होव्हन कव्हर वापरल्यास कॅनोपी तापमान 2-5°C पर्यंत कमी होते, पाण्याची कार्यक्षमता वाढते आणि सनबर्न टळतो.
- कॅनोपी मॅनेजमेंट: जास्तीचे शूट काढा परंतू पाने जास्त काढू नका. निघालेल्या द्राक्ष घडावर सावली राहील अशी व्यवस्था ठेवा त्याच बरोबर ऑक्टोबर महिन्यातील गरम वायूचा प्रवाह राखा.
- वाऱ्यापासून संरक्षण: वायूवेग जास्त असल्यास वायूरोधक झाडे लावा. यामुळे बाष्पीभवन 15-20 टक्के कमी होते.
- उत्पादन उद्दिष्टानुसार (उदा., स्थानिक बाजार, निर्यात किंवा मनुका उत्पादन) द्राक्ष घड ठेवा. वेलींच्या अंतर आणि काडीच्या व्यासासारख्या घटकांनुसार गुच्छ धारण समायोजित करून उत्पादन आणि गुणवत्ता यांचा मेळ मिळवा.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद-राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, पुणे
ICAR National Research Centre for Grapes, Pune
NRCG

पाणी व्यवस्थापन – सर्वात महत्त्वाचे

- ठिबक सिंचन आणि अचूक पाणी नियोजन: ठिबक सिंचन अनिवार्य आहे. सब-सर्फेस (जमिनीखालील) ठिबक वापरल्यास बाष्पीभवन कमी होते. मातीच्या ओलाव्याचे सेन्सर वापरून फक्त गरजेपुरते पाणी द्या. पाणी सकाळी किंवा संध्याकाळी द्या, दुपारी टाळा.
- शेततळे आणि पाणी साठवण: प्रत्येक बागेत शेततळे बांधून पावसाचे पाणी साठवा. काही प्रगत शेतकऱ्यांनी यामुळे कोट्यवधी लिटर पाणी वाचवले आहे व त्याचा निजोजाण पूर्वक वापर करावा .
- मल्चिंग: बोदावर बागासे, गवत, पालापाचोळा किंवा प्लास्टिक मल्चिंग करा. यामुळे मातीचे तापमान नियंत्रित राहते, ओलावा टिकतो आणि 20-25 टक्के पाणी वाचते. अँटी-ट्रान्सपिरंट (अँटीस्ट्रेस) फवारणीसोबत मल्चिंग केल्यास आणखी बचत होते.
- नियंत्रित पाण्याचा ताण: काही वाढीच्या अवस्थेत हळूवार पाण्याचा ताण दिला तर गुणवत्तेला फायदा होतो, पण जास्त ताण टाळा. जमीन वाफसा स्थितीत ठेवा.

IV. रोग व्यवस्थापन (डॉ. सुजॉय साहा):

फळ छाटणी नंतरचे दिवस	रोगांचा धोका			
	केवडा	भुरी	बुरशीजन्यकरपा	इतर
37	**कमी**	**नाही**	**मध्यम**	जिवाणू करपा- जास्त. तांबेरा – **कमी**

भारतीय कृषी संशोधन परिषद-द्राक्ष शोध संस्था संशोधन केंद्र, पुणे
ICAR-National Research Centre for Grapes, Pune

फळछाटणीपूर्वी किंवा छाटणीनंतर लगेचच ट्रायकोडर्माचा वापर ठिबक सिंचनाद्वारे करावा. छाटणीनंतर, रोगाचा प्राथमिक संसर्ग (इनोकुलम) असल्यास ते काढून टाकण्यासाठी कॉर्डन मॅनकोझेब आणि गंधकाने धुवावे. 'पोंगा' अवस्थेत १.५ ग्रॅम/लिटर दराने कॉपर हायड्रॉक्साईडची फवारणी करावी. ३-५ पानांच्या अवस्थेपूर्वी कोणतेही आंतरप्रवाही बुरशीनाशक फवारू नये. जर पीक वाढीच्या अवस्थेत असेल तर कोवळ्या पानांच्या तात्काळ संरक्षणासाठी एमिसुलब्रोम @375 मिली/हे/सायझोफॅमिड @ 200 मिली/हे/ऑक्साथिओपिप्रोलिन+मँडिप्रोपॅमिड @ 700 मिली/हे/ऑक्साथिओपिप्रोलिन+एमिसुलब्रोम @ 312.5 मिली/हे/फ्लुओपिकोलाइड+फोसेटाइल-अल @ 2.25- 2.50 किलो / हे. यांची फवारणी करावी. रात्र आणि दिवसाच्या तापमानातील बदलांमुळे पानांच्या पृष्ठभागावर दव दिसून येत असल्यास, ३-५ किलो प्रति एकर दराने मॅनकोझेबची धूळ फवारणी करावी.

V. कीड आणि त्याचे व्यवस्थापन (डॉ. डी. एस. यादव):

फळ छाटणी वाढीचा टप्पा: सुप्त कळी ते कोंब फुटणे

• सैल झालेली साल काढून टाका आणि बुप्रोफेझिन २५ एससी @ १.२५ मिली/लिटर पाणी या द्रावणाने झाडांना प्रतिबंधात्मक धुलाई द्या. १५ दिवसांच्या अंतराने, पिठ्या ढेकूण आणि मुंग्यांच्या नियंत्रणासाठी मेटारिझियम, ब्युव्हेरिया आणि लेकानिसिलियम यांसारख्या कीटकनाशक बुरशीने झाडांना धुलाई करणे उपयुक्त ठरू शकते.

• जमिनीतील भुंग्याच्या अळ्या, थ्रिप्सची कोष आणि मुंग्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी फळ छाटणीनंतर लगेचच मेटारिझियमने जमिनीला भिजवा.

• भुंग्याच्या व्यवस्थापनासाठी, द्राक्षबागेच्या आतून आणि आजूबाजूचे तण काढून टाका. दोन ओळींमधील जागेत कुळवणी करता येते. लॅम्डा सायहॅलोथ्रिन ४.९ सीएस (२०० मिली प्रति एकर) किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एसएल (१६० मिली प्रति एकर) किंवा फिप्रोनिल ८० डब्ल्यूजी (२५ ग्रॅम प्रति एकर) किंवा स्पिनोसाद ४५ एससी (१०० मिली प्रति एकर) यांची फवारणी केली जाऊ शकते. ही फवारणी शक्यतो रात्री करावी.

फळ छाटणीनंतरची वाढीची अवस्था: नवीन फुटींची सक्रिय वाढीची अवस्था

• या काळात तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव दिसून येऊ शकतो. नियंत्रणासाठी लॅम्बडा सायहॅलोथ्रिन ४.९ सीएस २०० मिली प्रति एकर, किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एसएल १६० मिली प्रति एकर, किंवा फिप्रोनिल ८० डब्ल्यूजी २५ ग्रॅम प्रति एकर यांपैकी कोणत्याही एका कीटकनाशकाची फवारणी करावी. अधिक प्रभावी निकालासाठी, ही फवारणी रात्रीच्या वेळी करावी आणि ट्रॅक्टरच्या मागे पांढऱ्या रंगाचा बल्ब लावून तो फवारणीदरम्यान सुरू ठेवावा. द्राक्ष बागेच्या आतून आणि आजूबाजूच्या परिसरातील तण काढून टाकावे.

• जर पीक फुलोऱ्याच्या आधीच्या अवस्थेत, फुलोऱ्यात किंवा मणी धरण्याच्या अवस्थेत असेल, तर फ्ली बीटल आणि फुलकिड्यांच्या नियंत्रणासाठी स्पिनोसॅड ४५ एससी (Spinosad 45 SC) १०० मिली प्रति एकर किंवा स्पिनेटोरम ११.७ एससी १२० मिली प्रति एकर यांपैकी एकाची फवारणी करावी; ही फवारणी रात्री करणे अधिक फायदेशीर ठरते. तसेच, फुलकिडे आणि अळ्यांच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टिन बेंझोएट ५ एसजी ८८ ग्रॅम प्रति एकर किंवा सायान्ट्रानिलिप्रोल १० ओडी २८० मिली प्रति एकर या औषधांचा वापर प्रभावी ठरतो.

• या काळात 'फ्ली बीटल'चा प्रादुर्भाव जास्त असू शकतो. त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी बागेतील आणि बाहेरील तण काढून टाकावे. दोन ओळींच्या दरम्यानच्या जागेत कुळवणी (harrowing) करावी. लॅम्बडा सायहॅलोथ्रिन ४.९ सीएस (२०० मिली/एकर), इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एसएल (१६० मिली/एकर), फिप्रोनिल ८० डब्ल्यूजी (२५ ग्रॅम/एकर) किंवा स्पिनोसॅड ४५ एससी (१०० मिली/एकर) यांपैकी कोणत्याही एका कीटकनाशकाची फवारणी करावी. ही फवारणी रात्रीच्या वेळी करणे अधिक योग्य ठरेल.

• सांगली, सोलापूर, नाशिक, पुणे आणि विजापूर भागातील द्राक्ष बागांमध्ये खोडकिड्याची (stem borer) एक नवीन प्रजाती (लाल रंगाची अळी) दिसून येऊ शकते, जी वेलीच्या सालीखाली राहते. अशा वेळी सैल झालेली साल काढून टाकावी आणि मुख्य खोड व फांद्यांवर (cordons) मेटारायझियम यांसारख्या कीटकनाशक बुरशीची फवारणी करून संपूर्ण वेलीला व्यवस्थित धुवून घ्यावे. @ ३-५ मिली/लिटर पाणी (प्रति रोप १.५ लिटर पाणी).